

# Ricercar del sesto tuono

Madrigali et Ricercari à 4 voci

Andrea Gabrieli

Intavolierung - Anton Höger

System 1 (Measures 1-5):  
L1-a':  $\delta \delta \delta \delta$  |  $c$  |  $a \delta a \delta c a \delta$  |  $\delta c a c$  |  $\delta$  |  $\delta \delta \delta$   
L2-a':  $a a a$  |  $b a \delta b \delta b$  |  $a c a a c$  |  $a$  |

System 2 (Measures 6-10):  
L1-a':  $\delta a a a f$  |  $\delta c a \delta a \delta$  |  $c a \delta \delta \delta$  |  $a c a a a$  |  $f h f \delta f \delta$   
L2-a':  $a a a b a$  |  $\delta b \delta b a c a \delta$  |  $b a \delta a c a$  |  $c \delta c a$  |  $\delta a$

System 3 (Measures 11-15):  
L1-a':  $c a \delta c a$  |  $c \delta a c c \delta a$  |  $c f c e f$  |  $c \delta a c a \delta$  |  $c a \delta \delta c$   
L2-a':  $\delta b a \delta c \delta c$  |  $\delta \delta a c$  |  $\delta c \delta a c \delta a$  |  $\delta a b a \delta a$  |  $\delta a \delta \delta$

System 4 (Measures 16-20):  
L1-a':  $\delta \delta \delta \delta$  |  $c$  |  $\delta \delta \delta \delta a c$  |  $a f$  |  $c c a a$   
L2-a':  $a$  |  $a a a$  |  $a$  |  $\delta \delta \delta a c \delta c$  |  $\delta \delta c \delta a c a$

22

f δ c a δ c a δ c a δ c a c a c δ

f δ c a δ

δ c a δ c a δ b a c a a c a c b a δ b a c b a c a a δ a c δ a

27

c a δ c a δ a c δ a c a c δ f δ c a δ c a δ c a δ c

c a c δ a δ b a δ b a c δ b a a δ a a a c δ a δ b a a δ

31

a δ a δ f c δ c f c δ c a c c c c c c c c

c δ b a c a δ δ b δ δ δ b δ c a δ δ δ δ δ

38

c δ c c c δ c c δ c a δ c a δ δ δ δ δ δ a c δ

δ δ δ c δ δ δ δ c a δ δ a δ b a c c a a a a a

43

f c a c e f e f f f d c d d c a c c a a a d

a d a c d a d a c a a a d c d d c a a a d b

48

c d d c a c c a d d c 1 d c 2 d f f d c c a l l k i

a a a b c c a d d d d d b a a a c a c a b d a a

53

h h h f d c a a c

b d d c a d